

INFORMACE PRO CHOVATELE

Vaderis – 5 g/l roztok k léčebnému ošetření včel

1. ŽADATEL O KLINICKÉ HODNOCENÍ A DRŽITEL POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÝ ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE

Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.
Máslovice - Dol 94
252 66 Libčice nad Vltavou
Tel. 734 858 244, e-mail: beedol@beedol.cz

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Vaderis 5 g/l roztok k léčebnému ošetření včel

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Léčivá látka: Rotenon – roztok – 5 g/l
Ostatní látky: Aceton – ad 1 l

4. INDIKACE

Vaderis je určen k hubení roztočů *varroa destructor* ve včelstvech včely medonosné (*Apis mellifera*) v době, kdy je ve včelstvu zavíčkovaný plod.

5. KONTRAINDIKACE

Viz bod 10 (Ochranná lhůta).
Nejsou známy

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Předávkování vyvolává zvýšený výskyt omámených včel na dně úlu až hynutí včel.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Včelstva včely medonosné (*Apis mellifera*)

8. DÁVKOVÁNÍ, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Přípravek pro nátěr víček pro požadované koncentrace účinné látky 2,5 g/l, 1 g/l a 0,5 g/l se připraví ředěním Vaderisu acetonem tímto způsobem:

1. koncentrace 2,5 g/l

Přípravek pro nátěr víček se připraví ředěním Vaderisu acetonem v poměru 1:1.

Do polyethylenového kelímku, který je součástí balení, se odměří 4 víčka přípravku Vaderis (tj. 20 ml) a přidají se 4 víčka acetonu (tj. 20 ml). Roztok se promíchá a použije k nátěru.

2. koncentrace 1 g/l

Přípravek pro nátěr víček se připraví pětinasobným ředěním Vaderisu acetonem.

Do polyethylenového kelímku, který je součástí balení, se odměří 8 víčka přípravku Vaderis (tj. 40 ml) a doplní se acetonem po značku 0,2l. Roztok se promíchá a použije k nátěru.

3. koncentrace 0,5 g/l

Přípravek pro nátěr víček se připraví desetinásobným ředěním Vaderisu acetonem.

Do polyethylenového kelímku, který je součástí balení, se odměří 4 víčka přípravku Vaderis (tj. 20 ml) a doplní se acetonem po značku 0,2l. Roztok se promíchá a použije k nátěru.

Léčivý přípravek natíráme na plodová víčka přiloženým štětcem. Součástí každého balení přípravku je štětec, polypropylénový kelímek na přelití přípravku. Na každém stanovišti použijte štětec nový. Potřebné množství přípravku na nátěr se přelije do přiloženého polypropylénového kelímku určeného pro následnou aplikaci nátěru štětcem.

Česno ponecháme otevřené. Nátěr provádíme pouze jednou, na veškerý zavíčkovaný plod. Přípravek NEPOUŽÍVEJTE na přímém slunečním světle.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Přesně dodržujte dávkování. Předávkování může vyvolat hnutí včel.

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Med: bez ochranných lhůt

Nepoužívat během snůšky. Veterinární léčivý přípravek je třeba použít pouze v období mimo snůšku a mimo dobu, kdy je ve včelstvu konzumní med, tj. používáme v předjaří, podletí a na podzim.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Přípravek uchováváme za teploty do 25 °C, mimo dosah slunečního záření, odděleně od potravin a krmiv mimo dosah dětí a nepovolaných osob.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u včel

Nepoužívat v době snůšky. Pokud je přípravek podán během snůšky, může vést k výskytu reziduí léčivé látky v medu. Výskyt reziduí v medu je minimalizován dobou aplikace a to v období mimo snůšku a dobu, kdy je ve včelstvu konzumní med, tj. používáme v předjaří, podletí a na podzim.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Přípravek obsahuje rotenon. Při nátěru a manipulaci s léčivem je nutné používat osobní ochranné prostředky, gumové rukavice a brýle. Přípravek může dráždit kůži, sliznice a alergizovat. Při nechtěném kontaktu kůže s roztokem zasažené místo okamžitě omyjte vodou a mýdlem. Vyvarujte se dotyku sliznic a očí kontaminovanou rukou.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODNĚNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU

Přípravek obsahuje rotenon, který je toxický pro ryby a další vodní organizmy! Nespotřebované zbytky a výplachy, nesmí zasáhnout vodní zdroje ani veřejnou kanalizaci. Všechny nepoužité veterinární léčivé přípravky nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku musí být likvidován podle místních právních předpisů

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Leden 2015

15. DALŠÍ INFORMACE

Doba použití je vyznačena na obalu.

Interakce

V kombinaci s léčivými přípravky obsahujícími pyrethroidy je přípravek pro včely jedovatý. NEPOUŽÍVEJTE s výrobky Gabon PF 90 mg, Gabon PA 1,5 mg, M-1 AER 240 mg/ml, MP-10 FUM 24 mg/ml a dalšími léčivými přípravky obsahující pyrethroidy.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na základě objednávky s náležitostmi veterinárního předpisu.